

Neurolyse

Fenol

Deze informatiefolder geeft u algemene informatie over een infiltratiebehandeling. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven

In te vullen door behandelaar

Wel/niet stoppen met bloedverdunners:

Ja, stoppen met de bloedverdunners _____ dagen

voor de behandeldatum

Nee, patiënt hoeft niet te stoppen

Niet van toepassing

Doel behandeling

Neurolyse wordt toegepast bij mensen met pijnklachten die veroorzaakt worden door beschadiging van zenuwweefsel en/of gewrichtskapsel. Het doel van de neurolyse is om de pijn te verlichten.

Wat is neurolyse?

Neurolyse is het verdoven/uitschakelen van zenuwtjes en/of gewrichtskapsel. Er kan een verdovende en ontstekingsremmende vloeistof of fenol (neurolytische vloeistof) ingespoten worden.

Vorbereiding behandeling

U hoeft thuis geen specifieke voorbereidingen treffen, tenzij uw pijnspecialist anders aangeeft.

Eten en drinken

In principe mag u gewoon eten en drinken en uw medicatie innemen, met uitzondering van bloedverdunners.

Medicijnen

Neemt u bloedverdunners? Overleg dan met uw pijnspecialist of u hiermee moet stoppen, voordat u behandeld wordt. Na de behandeling kunt u weer met de bloedverdunners doorgaan.

Gebruikt u antibiotica? Geef dit dan voorafgaand aan de behandeling door aan uw pijnspecialist.

Allergieën

Heeft u een allergie voor jodium of andere ontsmettingsmiddelen, pleisters, contrast- of verdovingsmiddelen? Meldt u dit dan voor de start van de behandeling.

Zwangerschap

Bent u zwanger of denkt u zwanger te zijn, dan moet u dit voor de behandeling aan ons doorgeven.

Vervoer

Op de dag van uw behandeling mag u niet actief deelnemen aan het verkeer. Zorg daarom voor een begeleider die u na de behandeling naar huis kan begeleiden.

Verloop behandeling

- Wij helpen u eerst om in de juiste positie op de behandeltafel te gaan liggen of zitten.

- Na het desinfecteren van de huid met een desinfecterende vloeistof wordt het behandelgebied met steriele doeken afgedekt.
- De pijnspecialist verdooft het te behandelen gebied, waarna met een speciale naald het pijngebied wordt opgezocht. Indien nodig wordt het röntgenapparaat gebruikt. De medicatie wordt ingespoten.
- Op de plaats van de injectie wordt een pleister geplakt, deze mag u na een paar uur verwijderen.
- De behandeling duurt ongeveer tien tot vijftientig minuten.

Na de behandeling

Na de behandeling wordt u naar de aftercare gebracht, waar u plaatsneemt in een comfortabele ligstoel. U wordt opgevangen en geobserveerd door een verpleegkundige dan wel doktersassistente. U mag iets meenemen ter ontspanning zoals een (puzzel)boek of muziek. Houd er rekening mee dat u dat u ongeveer één à twee uur op de afdeling verblijft.

Mogelijke bijwerkingen

We voeren de behandeling vanzelfsprekend zorgvuldig uit. Toch bestaat er een geringe kans op het optreden van bijwerkingen.

- Napijn; dit is slechts tijdelijk en verdwijnt na enkele dagen. U mag pijnstillers innemen.
- Een doof gevoel in het behandelde gebied.
- Krachtvermindering in het behandelde gebied. Dit is tijdelijk van aard.
- Als bij het prikken een bloedvatje is geraakt, kan een bloeding ontstaan. Dit veroorzaakt soms wat pijn.

Als er corticosteroïden zijn gebruikt:

- Opvliegers en een rood warm gezicht. Deze bijwerkingen kunnen bij zowel vrouwen als mannen voorkomen
- Bij vrouwen kan de menstruatie korte tijd verstoord raken.
- Bij diabetici kan gedurende enkele dagen verhoging van de bloedsuiker optreden. Blijft dit aanhouden, dan raden wij u aan contact op te nemen met uw huisarts of diabetesverpleegkundige.
- In zeldzame gevallen kan er een verkleuring van de huid optreden. Dit verdwijnt in de meeste gevallen.

Resultaat behandeling

Het effect van de behandeling houdt doorgaans enkele maanden aan. De behandeling kan indien nodig herhaald worden, waarbij dan weer dezelfde voorzorgsmaatregelen worden genomen.

Leefregels

U kunt de dag na de behandeling uw activiteiten weer hervatten, tenzij de Pijnverpleegkundige/-consulente of pijnspecialist anders met u heeft afgesproken. Het is belangrijk om in beweging te blijven waarbij u overbelasting probeert te vermijden.

Controle

Na acht weken ontvangt u van het Centrum voor Pijngeneeskunde een email of brief met de vraag of de behandeling voor u succesvol is geweest. Indien nodig kunt u dan een telefonisch consult afspreken met de pijnverpleegkundige/-consulent.

Contact

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Pijngeneeskunde. Dit kan van maandag tot en met vrijdag van 8.30 -11.00 uur en van 13.00 – 16.00 uur via telefoonnummer 088-125 48 18.

